

100G/L(10%W/V)溶液

用天王[®],呼你每天做大王

Alto[®]

syngenta.



天王[®]

系統及接觸性殺菌劑

- 具接觸性和系統性
- 預防性兼治療性
- 快速被植物吸收，不怕雨水沖刷
- 長效性
- 葉面滲透性佳



■ 天王® 的特性

具系統性及接觸性，在短時間內快速展現防治效果
具預防性兼治療性，可有效控制病害，長期保護作物
具長效性，可以殺滅入侵的病菌及阻止病菌生長或產孢

■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
落花生	銹病	0.33公升	3000	播種後如發現病斑時應即施藥，以後每隔10天施藥一次，共施藥四次。	本藥劑試驗時加展著劑(SANDOVIT) 2000倍。採收前7天停止施藥。
香蕉	葉黑星病	0.5公升		加水至30公升/公頃，以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片，每隔14天噴一次，連續四~五次。	本藥劑試驗時每公頃加展著劑(SANDOVIT)100公撮。採收前15天停止施藥。

■ 儲藏或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童、家畜及水源。
使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
2. 本藥劑使用於調配、稀釋及施藥時，應注意穿戴防護衣物。

■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 在施藥之前，請詳細閱讀產品上的包裝標示，並請嚴格遵守所推薦的適用範圍及安全使用方法。
- 廢容器清洗及回收方法，詳請參閱標籤。



syngenta.