

好加讚® -325g/L(32.5%W/V)水懸劑

# 好加讚® -收成滿載

 Amistar Top®

syngenta®



## 好加讚®

### 廣效型殺菌劑

- 預防性兼治療性殺菌劑
- 滲透，移行性佳
- 耐雨水沖刷



■ 「好加讚」是由先正達擷取兩家母公司之精髓產品--稱無限<sup>®</sup>和炭剋<sup>®</sup>所製成之全新的廣效性殺菌劑


炭剋<sup>®</sup>是一種高浸透性的 EBI-Triazole 類藥劑，藉著阻礙真菌細胞膜重要構成成分-麥角醇的合成，來抑制病菌的發展。

● 以真菌的生活環來看，炭剋<sup>®</sup>對真菌菌絲的生長、病斑的形成以及孢子的形成具有較佳的效果，因而在田間農友反應對病害治療效果佳。

稱無限<sup>®</sup>的作用機制是結合在真菌粒線體的細胞色素b，阻斷細胞色素b和細胞色素c之間的電子傳遞，而達到抑制真菌的呼吸作用。


稱無限<sup>®</sup>可以系統性的抑制孢子發芽、附著器和侵入釘的形成及游走子的游動性與抑制菌絲生長及孢子再發芽，故針對預防性及病原菌早期侵入感染的時期特別有效。

### 炭剋<sup>®</sup>作用點



### 稱無限<sup>®</sup>的作用機制

#### 細胞粒線體結構



● 炭剋<sup>®</sup>和稱無限<sup>®</sup>混合劑有相輔相成的效果，讓病害無所遁形。

### 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
瓜果類	炭疽病	0.5-0.6公升	2000	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次。	採收前9天停止施藥。

## ■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
豆菜類	炭疽病	0.3-0.4公升	2000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.豆菜類限結莢前使用。 2.採收前7天停止施藥。
大豆					1.限毛豆使用。 2.採收前7天停止施藥。
豆薯					採收前14天停止施藥。
蓮霧	炭疽病		3000	開花盛期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續五次。	1.採收前30天停止施藥。 2.限於開花期使用。
檸檬 香蕉 木瓜 番荔枝 酪梨 紅龍果 百香果 紅毛丹 龍眼 荔枝	炭疽病		3000	開花初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次；接著每隔14天施藥一次，至套袋為止。	採收前21天停止施藥。
茶	炭疽病	0.3-1.0公升	3000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.適用於茶葉。 2.採收前21天停止施藥。
山茶					
花木	炭疽病	0.3-1.3公升	2000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，連續三次。	限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。

## ■ 好加讚® 作用機制：11,3

依據抗藥性防治策略，輪用不同作物機制藥劑可確保相同作用機制藥劑免受抗藥性汰選，達到永續及有效防治之目的。

## ■ 儲存或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜。
2. 具呼吸中等毒及對蜜蜂相對無毒。
3. 勿使用於「自來水水質水量保護區」、「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。
4. 使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
5. 稀釋藥劑時，應穿戴防護眼鏡及橡膠手套，避免藥劑刺激眼睛及造成皮膚搔癢。若藥劑觸及眼睛或皮膚，立即以清水沖洗之。噴施藥劑時，應站立於上風處，避免身體直接觸及藥劑。

## ■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 本藥劑為水懸劑，使用前請先搖均勻再使用。
- 在施藥之前，請詳細閱讀產品上的包裝標示，並請嚴格遵守所推薦的適用範圍及安全使用方法。
- 廢容器清洗及回收方法，詳請參閱標籤。



 **Amistar Top<sup>®</sup>**

**syngenta.**



**台灣先正達股份有限公司**

台北市敦化南路一段2號11樓B區 電話:(02)2559-2901 傳真:(02)2772-3990  
網址:www.syngenta.com.tw

農藥廣告字第110123號  
農藥許可證農藥進字第3135(亞托克利)、  
1825(亞托敏)、3116(待克利)號