


治直好® 44% w/v 混合水懸劑

呼你收成直直好!



治直好®
(四氯曼普胺)

syngenta.



治直好®

保護型殺菌劑


- 雙重防護機制：廣效保護及預防葉部病害
- 迅速吸附在葉片表面，形成保護層
- 良好的滲透移行性，保護作物
- 耐雨性佳，噴後約 1 小時達保護作用
- 適合為病害抗藥性管理之藥劑
- 幫助提升作物產量及作物價值



■ 治直好® 的生物特性

<p>曼普胺</p> <p>四氯異苯腈</p>	<p>保護性</p> <p>→</p> <p>保護性</p> <p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 有效抑制孢子、孢子囊發芽 ● 抑制菌絲生長和吸器形成 ● 抑制產孢 <ul style="list-style-type: none"> ● 抑制孢子發芽 ● 防止病原菌入侵植物組織 ● 預防性的接觸型效果
-------------------------	---	---

■ 治直好® 在植物體表現



■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
十字花科蔬菜	露菌病	1.6-2.0公升	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前12天(設施栽培18天)，包葉菜類採收前21天(設施栽培27天)停止施藥。

■ 儲存或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜。
2. 具呼吸劇毒，中度眼刺激性，水域禁用。
3. 勿使用於「自來水水質水量保護區」、「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。
4. 使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。

■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 農藥廢容器清洗及回收方法，請參閱標籤。



syngenta.