

呼您發® 23%(W/W)水懸劑

呼您發®, 呼您發大財!



syngenta.



呼您發®

廣效性殺菌劑

- 系統性殺菌劑
- 具預防及治療雙重效果
- 滲透，移行性佳



呼您發® 的特點

具系統性 - 有良好的滲透移行能力，藥效維持較久
 兼具預防及治療效果 - 快速抑制真菌孢子發芽及菌絲生成
 優異水懸劑，沖泡均勻，確保藥效
 輕毒性，對環境低污染

推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
水稻	紋枯病	0.3公升	4000	病害發生初期開始施藥，以後每隔14天施藥一次，連續三次。	採收前14天停止施藥。
蔥科 小葉菜類	銹病	0.1-0.3公升	6900	病害發生初期開始施藥，每隔7-10天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。
蔥科 根菜類	銹病	0.1-0.3公升	6900	病害發生初期開始施藥，每隔7-10天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。
韭	銹病	0.13-0.17公升	7000	病害發生初期開始施藥，每隔7-10天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.限使用於韭菜，不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。
茭白筍	銹病	0.13公升	9000	病害發生初期開始施藥，每隔14天施藥一次，連續三次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「CS-7來著通」2000倍。 2.幼苗種植45天後或株高120公分以上才開始使用。 3.採收前6天停止施藥。
甘藷	基腐病	1.1公升	3500	栽培初期於植株地基部澆灌一次，每隔7天施藥一次，共三次。	採收前9天停止施藥。
豆科 乾豆類	白粉病	0.07-0.09公升	9000	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.使用範圍：豆科乾豆類（紅豆除外）白粉病。
落花生	銹病	0.17公升	7000	病害發生初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續四次。	採收前7天停止施藥。
胡麻	白粉病	0.07-0.13公升	9000	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
胡瓜	白粉病	0.11公升	9000	病害發生初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次。	採收前14天停止施藥。

■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
金 針	銹 病	0.1-0.3公升	6900	病害發生初期開始施藥，每隔7-10天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
鼠李科 梨果類	白粉病		14000	病害發生初期開始施藥。	採收前6天停止施藥。
梨	白粉病	0.06-0.15 公升	14000	病害發生初期開始施藥，每隔7-10天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
	黑星病			病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續六次。	
草 莓	白粉病	0.09-0.22 公升	9000	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
葡 萄	白粉病	0.06-0.09 公升	14000	病害發生初期開始施藥，每隔7-10天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
桃	銹 病		7000	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續四次。	採收前6天停止施藥。
	白粉病	0.06-0.15 公升	14000	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	
	縮葉病		9000	病害發生初期開始施藥，每隔10天施藥一次。	

■ 呼您發[®] 作用機制：3

依據抗藥性防治策略，輪用不同作物機制藥劑可確保相同作用機制藥劑免受抗藥性汰選，達到永續及有效防治之目的。

■ 儲藏或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜，使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
2. 本劑為新型系統性殺菌劑，兼具治療及預防的效果，可以用來有效防治經濟作物的葉部及果實病害。
3. 具中度眼刺激性。
4. 對水生物具中等毒性。
5. 泡藥及噴施藥劑時應注意事項：
 - 使用藥劑時，勿抽煙及飲食。
 - 泡藥時，請穿戴防護眼鏡及橡膠手套，避免高濃度藥液刺激及造成皮膚搔癢。
 - 泡藥若藥劑觸及眼睛或皮膚，立即以清水沖洗之。
 - 當噴施藥劑時避免讓身體觸及藥液。
 - 為避免殃及魚類，請勿將本藥直接噴施於池塘、河川。

■ 儲藏或使用時應注意事項

6. 噴施藥劑後應注意事項：

- 施藥者須徹底潔淨肌膚，並換下工作服。
- 未用完之藥劑須妥善存放(鎖緊)，勿讓孩童拿到，並遠離食物。

■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 施藥之前，請詳細閱讀產品上的包裝標示，並請嚴格遵守所推薦的適用範圍及安全使用方法。
- 廢容器清洗及回收方法，請參閱標籤及仿單。
- 吞食本藥時勿使吞食者嘔吐之，立即將人及藥瓶送醫處理。



syngenta.

syngenta. 台灣先正達股份有限公司

台北市敦化南路一段2號11樓B區 電話:(02)2559-2901 傳真:(02)2772-3990
網址: www.syngenta.com.tw

農藥廣告字第000000號
農藥許可證農藥進字第2362號