

穩妥當® 280g/L(28% W/V)水懸混劑

# 作物收成穩妥當！

 Amistar Xtra®

syngenta.



# 穩妥當®

## 廣效型殺菌劑


- 耐雨性佳
- 滲透移行性佳
- 發病初期使用效果佳



■ **穩妥當**<sup>®</sup> 為由先正達**稱無限**<sup>®</sup> 技術 (Amistar Technology) 和環克座所合成之廣效性殺菌劑產品，兼具預防性及治療性，適合抗藥性管理，提升作物品質及產量！

## ■ 產品特性

- **稱無限**<sup>®</sup> (亞托敏) 可以系統性的抑制孢子發芽、附著器和侵入釘的形成及游走子的游動性與抑制菌絲生長及孢子再發芽，故針對預防性及病原菌早期侵入感染的時期特別有效。
- 環克座是廣效性的殺真菌劑，為高滲透性及移行性的麥角醇抑制劑，藉著阻礙真菌細胞膜重要構成成分—麥角醇的合成，來抑制病菌的發展。
- **穩妥當**<sup>®</sup> 預防使用，效果更佳—兼具接觸性和系統性，同時也兼具預防性及治療性，在低濃度下即具有防治效果，一經施用，很快就能進入植物體內展現防治功效，並且能維持一段很長的時間。
- **穩妥當**<sup>®</sup> 作用時間點：



### ● **穩妥當**<sup>®</sup> 系統移行、滲透性佳

- **穩妥當**<sup>®</sup> 噴佈在作物葉面時，大約30分鐘後即滲入作物體內，不怕雨水沖刷。
- **穩妥當**<sup>®</sup> 施用在根部時，可以系統性的移行到葉梢或頂芽，殺死入侵的病原菌或阻止其生長或產孢。



## ■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		使用時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
蔥科 小葉菜類	銹病	0.3-0.7公升	3000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
蔥科 根菜類					

## ■ 儲藏或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜，使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
2. 稀釋藥劑時，應穿戴防護眼鏡及橡膠手套，避免藥劑刺激眼睛及造成皮膚搔癢，施用時亦避免身體觸及藥劑。
3. 在推薦的劑量下對作物安全無虞，稀釋倍數如果到達1000倍以下，則和其他麥角醇抑制劑農藥一樣會對作物產生藥害症狀（包括：矮化、畸形、葉面減生或葉燒等）。

## ■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 廢容器清洗及回收方法，請參閱標籤及仿單。



 **Amistar Xtra**<sup>®</sup>

**syngenta**



總經銷商：福界興業有限公司 電話：06-7233835-6  
總經銷地址：台南市佳里區東寧里文化路133巷16號

農藥廣告字第107008號  
農藥許可證農藥進字第02667 01825號

