

滿堂彩® 500g/L(50%W/V)混合乳劑

# 呼你收成滿堂彩®！



## 雙效型殺菌劑

- 含兩種有效成份，兼具保護與治療性
- 系統移行性快速，不怕雨水沖刷
- 作物生長強壯，不易倒伏，確保產量



## ■ 滿堂彩® 的特性

保護兼治療：同時具有保護性與治療性，殺菌速效又持久  
系統移行性：快速滲透移行，內外兼治病害且不怕雨水沖刷  
藥效更穩定：含有兩種有效成份，具互補作用，不易產生抗性  
生長更強壯：防止作物徒長及倒伏，確保產量



玉米銹病感染初期



玉米銹病感染後期



嚴重被害玉米植株



莖桿硬挺



莖桿硬挺



葉面感染

紋枯病



基部病斑

紋枯病

## ■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
玉米	銹病	0.2公升	5000	自發病開始時施藥一次，每隔7-10天再施藥一次，連續兩次，計施藥三次。	1.施藥時藥液須均勻噴施於葉片上下二面。 2.採收前9天停止施藥。
水稻	紋枯病	0.333公升	3000	病害發生初期開始施藥，必要時每14天施藥一次，共2次。	採收前21天停止施藥。

## ■ 滿堂彩® 作用機制：3

依據抗藥性防治策略，輪用不同作物機制藥劑可確保相同作用機制藥劑免受抗藥性汰選，達到永續及有效防治之目的。

## ■ 儲存或使用時應注意事項

- 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜，使用時需先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
- 本劑具強皮膚及眼刺激性，使用時請戴護目鏡及防護衣物。
- 對水生物具毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區」、「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」，禁用於水域。

## ■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 施藥之前，請詳細閱讀產品上的包裝標示，並請嚴格遵守所推薦的適用範圍及安全使用方法。
- 廢容器清洗及回收方法，詳請參閱標籤及仿單。

