

蛾樂天® 50g/L(5%W/V)乳劑

呼大蟲,小蟲,快樂上天堂~



syngenta®




蛾樂天®

打卵及胃毒型殺蟲劑

- 長效
- 作物忍受性高，使用無困擾
- 耐雨性，不易被雨水沖刷，效果較長



■ 蛾樂天® 作用機制



- ⇨：阻礙蛻皮
藉著干擾昆蟲外骨骼幾丁質的合成，來達到目的。
- ⇨：阻礙蛹化
- ⇨：阻礙孵化
攝食本劑之雌成蟲產下之卵不孵化。

■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
十字花科 包葉菜類	紋白蝶	0.67公升	1500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
十字花科 小葉菜類					
蔥科小葉菜類	夜蛾類	0.5-1.3公升 0.6-0.8公升	1500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
蔥	夜蛾類	0.6-0.8公升	1500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
蔥科根菜類		0.5-1.3公升 0.6-0.8公升			
草莓		0.5-1.3公升			採收前7天停止施藥。
果菜類	夜蛾類	0.6公升	1500	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，連續兩次。	採收前6天停止施藥。
番茄					
花木	夜蛾類	0.4-1.7公升	1500	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，最多兩次。	限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。

■ 蛾樂天® 作用機制：15

依據抗藥性防治策略，輪用不同作物機制藥劑可確保相同作用機制藥劑免受抗藥性汰選，達到永續及有效防治之目的。

■ 儲存或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜。
2. 對蜜蜂具毒性。
3. 勿使用於「自來水水質水量保護區」、「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。
4. 使用時需先閱讀使用方法及適用範圍及仿單後再使用。

■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

- 害蟲早期施用，效果最佳。
- 老齡幼蟲，因代謝較緩慢，且體積較大，故需要較高劑量才能防除。
- 主要作用在於害蟲取食，沒有系統性，因此需1~3天才有效果，但也因此具有長效性。
- 對剛下蟲卵有效，可抑制孵化。
- 對有益天敵和捕植蹣較無害，藥效更穩定。
- 對甲殼類動物有毒，應避免用於養殖池附近。



 蛾樂天®

syngenta.

syngenta. 台灣先正達股份有限公司

台北市敦化南路一段2號11樓B區 電話:(02)2559-2901 傳真:(02)2772-3990
網址:www.syngenta.com.tw

農藥廣告字第110157號
農藥許可證農藥進字第2069(綠芬隆)號