

好綠旺® 5%水溶性粒劑

用到好綠旺®, 害蟲不敢惡~

 Proclaim®

syngenta.




好綠旺®

胃毒型殺蟲劑

- 具強滲透移行性
- 為生物製劑，適合為抗藥性管理的輪用藥劑



■ 好綠旺® 作用機制



■ 產品特性

好綠旺® 迅速麻痺害蟲，藥效較昆蟲生長調節劑或蘇力菌快速，因此可以立即阻止作物被害蟲危害。

好綠旺® 生物製劑和作用機制，對於其他傳統藥劑已有抗藥性的害蟲，仍然有效防治，適合做為殺蟲劑抗性管理的輪用藥劑。

好綠旺® 具有強滲透性，在植物組織內形成一個保護層，提供長達7-11天的殘效，而且不受降雨或灌溉的影響。

好綠旺® 可由根部快速吸收，對隱藏的害蟲或剛孵化的害蟲一樣有效。

好綠旺® 為水溶性粒劑，無粉塵，農民使用較為安全；不含有機溶劑，作物忍受性高，作物明顯較為強壯，產量也相對提高，可增加農民的收益。

■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
十字花科 包葉菜類	螟蛾類	0.15-0.2公斤	5000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
	夜蛾類				
	紋白蝶				
	植食性瓢蟲類				
	螟蛾類				
	夜蛾類				
	紋白蝶				
	植食性瓢蟲類				1.本藥劑試驗時加展著劑「CS-7」3000倍。 2.採收前9天停止施藥。

■ 推薦使用方法及適用範圍

作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每 次施藥量	稀釋 倍數		
十字花科 小葉菜類	螟蛾類	0.15-0.2公斤	5000	害蟲發生時開始施藥，必要 時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
	夜蛾類				
	紋白蝶				
	植食性瓢蟲類				
	螟蛾類				
	夜蛾類				
	紋白蝶				
甘 藍	小菜蛾	0.15-0.2公斤	5000	害蟲發生時開始施藥，必要 時隔7天施藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑 「CS-7」3000倍。 2.採收前9天停止施藥。
	紋白蝶				
結球萵苣	夜蛾類	0.2-0.4公斤	4000	害蟲發生時開始施藥，必要 時隔7天施藥一次。	採收前9天(設施栽培15 天)停止施藥。
蔥科根菜類 蔥科小葉菜類 蔥	夜蛾類	0.2公斤	5000	害蟲發生時開始施藥，必要 時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
大 豆	夜蛾類	0.1-0.2公斤	3500	害蟲發生時開始施藥，必要 時隔7天施藥一次。	1.採收前3天停止施藥。 2.限採收乾大豆者使用。
豆菜類 葉用豌豆 豆科根菜類 豆科小葉菜類			5000		採收前3天停止施藥。
毛 豆		0.3-0.4公斤	4000		
瓜菜類 瓜果類 瓜果類	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時開始施藥，必要 時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
瓜菜類 瓜果類		0.2-0.3公斤	4000		
菊科包葉菜類 菊科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時開始施藥，必要 時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。 採收前6天停止施藥。
旋花科小葉菜類 莧 菜	鱗翅目害蟲 夜蛾類	0.1-0.3公斤 0.06-0.2公斤	5000	害蟲發生時開始施藥，必要 時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
葫蘆科小葉菜類 繖形花科 小葉菜類		0.2-0.4公斤 0.1-0.6公斤			
唇形花科 小葉菜類 藜科小葉菜類 香 椿		0.1-0.2公斤			採收前9天停止施藥。
茄科根菜類 茄科小葉菜類 茄科果菜類	夜蛾類	0.1-0.4公斤	3500	害蟲發生時開始施藥，必要 時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。 採收前6天停止施藥。
馬鈴薯	番茄潛旋蛾	0.1-0.4公斤	3500	害蟲發生時開始施藥，每隔 7天施藥一次，共兩次。	採收前14天停止施藥。 (緊急防治用藥)



Proclaim®


syngenta®

■ 推薦使用方法及適用範圍


作物	使用範圍	使用方法		施藥時期及方法	注意事項
		每公頃每次施藥量	稀釋倍數		
番 茄	夜蛾類	0.23-0.3公斤	4000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
	番茄潛旋蛾	0.1-4.0公斤	3500		
茄 子				害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，共兩次。	緊急防治用藥。 採收前6天停止施藥。
甜 椒		0.1-0.4公斤			
辣 椒					
金 針	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
草 莓					
花 木	夜蛾類	0.2-0.6公斤	4000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，最多三次。	1.限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 2.避免於開花期使用。
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥一次。	施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。

■ 好綠旺® 調配藥劑小技巧:

● 小技巧1.



● 小技巧2.



■ 儲存或使用時應注意事項

1. 本劑應儲存於乾燥冷涼之處，並遠離孩童及家畜，使用時須先閱讀使用方法及適用範圍後再使用。
2. 對水生生物有毒，勿使用於「自來水水質水量保護區」、及「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」禁用於水域。
3. 因滅汀作用機制為6，為減緩抗藥性發生，請勿連續使用相同作用機制之產品，應與其他不同作用機制之要劑輪替使用。
4. 對蜜蜂有毒性，請勿使用於蜜蜂飛行活動區域，避免噴灑飄散至開花雜草及開花作物種植區域，並請勿於開花期前、後一定天數施藥於作物上。
5. 如未穿著防護措施設備，施藥24小時請勿重複進入施藥區域。
6. 具中等皮膚刺激性、強烈眼睛刺激性，請確實穿戴安全設備後再操作使用。
3. 展著劑「CS-7」具嚴重眼刺激性，意外接觸可能造成眼睛永久傷害，另具中度皮膚刺激性，使用時應注意防護措施；閃火點37°C，易燃。

■ 使用注意事項及農業用藥安全圖示

1. 添加非離子型展著劑，如CS-7，可避免藥劑快速流失，明顯提高藥效。
2. 泡藥要訣是先將展著劑加入少量水中，再加入量好的藥劑，浸泡一會兒待藥劑顆粒軟化溶解後，再攪拌並加入水中。
3. 最好於清晨或傍晚、陽光不強時施藥，可增加藥劑滲入的時間。
4. 噴藥水量盡量充足，並盡可能噴及葉面和葉背。
5. 農藥廢容器清洗及回收方法，請參閱標籤。



 **Proclaim**®

 **syngenta.**

 **台灣先正達股份有限公司**

台北市敦化南路一段2號11樓B區 電話:(02)2559-2901 傳真:(02)2772-3990
網址:www.syngenta.com.tw

農藥廣告字第110380號
農藥許可證農藥進字第2084(因滅汀)號